

LA CASTRACION DE SUS MASCOTAS (YOUR PETS NEUTER OPERATION)

La castración implica una extirpación quirúrgica de ambos testículos. Es un procedimiento bastante más simple y menos invasivo que la esterilización.

Cuando su mascota es admitida en nuestra clínica se le coloca en una jaula confortable donde se recobrará de la cirugía. A los perros se les administra medicación para calmar los efectos y minimizar el daño derivado de la anestesia general. En perros, la anestesia general es administrada a través de la vena. Posteriormente es insertado un tubo de plástico en la tráquea para suministrar anestesia y oxígeno durante la operación. En los gatos, la anestesia general es administrada vía muscular y se usa una máscara para suministrar anestesia y oxígeno mientras dure la cirugía.

El área alrededor de los testículos es depilada y limpiada cuidadosamente con desinfectante para matar y eliminar cualquier bacteria presente. Entonces es llevado a la sala de operaciones. Todas nuestras operaciones se realizan con guantes e instrumentos esterilizados. En los perros, el corte se realiza en el escroto y los testículos son extirpados a través del corte. El fluido de sangre es paralizado con doble sutura de material que será absorbido en 60 días. La incisión es entonces cerrada con suturas absorbentes.

En los gatos, un corte es hecho en el escroto de cada testículo. Este es extirpado y el flujo sanguíneo es interrumpido. La incisión cicatrizará sola y no será necesario puntos de sutura. Si su mascota tiene sobrepeso o padece *Cryptorchidism* o testículos descendentes, la cirugía resultará más complicada. En este tipo de animales, el testículo anormal puede encontrarse en el área del abdomen o en el costado y esto requiere una segunda incisión para recuperarlo.

Cuando la operación ha finalizado, la mascota es llevada al área de cuidados. Ese mismo día, más tarde, su animal estará listo para ir a casa. Algunos deben pasar la noche allí pero estarán preparados para ser recogidos a la mañana siguiente. Si este fuera el caso de su mascota nuestro equipo se lo comunicaría tras la operación. Es esencial mantener al animal lo más quieto posible hasta que hayan pasado 5 o 7 días después de la cirugía. El escroto se visualizará como un saco vacío. Ocasionalmente se mostrará una leve hinchazón, especialmente en perros y gatos adultos haciendo parecer que no han sido castrados. Esta hinchazón disminuirá en un periodo de tiempo.

Por favor llame a Seattle Humane Society al 425 6497560 si surge algún problema tras la cirugía como podría ser la falta de apetito, que sangre o supure por la incisión, hinchazón alrededor de la herida, dolor o si el animal aumenta de fiebre. La temperatura rectal normal para perros y gatos es de 101 a 102.5F. Si está muy preocupado por el estado de su mascota y no puede contactar con Seattle Humane Society por favor acuda a su veterinario privado o a un Hospital Veterinario de Urgencias.

INSTRUCCIONES POSTERIORES A LA OPERACIÓN

ALIMENTACION

Los animales que hayan salido entre las 3 y 5 pm deberán ser alimentados con una pequeña comida cuando lleguen a casa. Dar su comida regular y que tengan agua fresca a su disposición. Seguramente tardara de 3 a 4 días en recuperar su apetito normal.

MEDICACION PARA EL DOLOR

La medicación se le proveerá mediante inyección después de la operación. No dar a su animal cualquier tipo de medicación sin antes consultar con su veterinario.

EJERCICIO RESTRINGIDO durante los primeros 5 a 7 días después de la cirugía. Mantengas separados unos animales de otros mientras estén en casa.

MANTENER LOS ANIMALES EN EL INTERIOR de 10 a 14 días. Su mascota debe estar caliente y seca. No se debe dar baños durante 10 días mientras la incisión este completamente cicatrizada. Un baño podría arrastrar la suciedad y las bacterias hacia la herida.

MIRAR LA INCISION Y observar la supuración o la hinchazón. Habrá un bulto duro debajo de la incisión donde los puntos interiores están cicatrizando. Hay una reacción normal a este material de sutura. Los puntos debajo de la piel se disolverán en 60 días. Intenten que su mascota no rasque o lame sus heridas. Use un collar Elizabeth, disponible en muchas tiendas de mascotas o cualquier agente amargo como "Chewguard" alrededor de la herida para evitar que tenga contacto con ella mientras cicatriza.

He leído y entendido mis instrucciones posteriores a la operación de mi mascota. Entiendo que si mi incumplimiento o falta de voluntad para completar estas instrucciones puedan ocasionar complicaciones o que si mi mascota desarrolla algún problema posterior a la cirugía pero que no esté relacionado con ella, por ejemplo infecciones respiratorias o tos, necesitare llevar mi animal a mi propio veterinario haciéndome responsable de los gastos que ello ocasione.

Firma del propietario

Día