

## **LA ESTERILIZACION DE LAS MASCOTAS ( YOUR PETS SPAY OPERATION)**

La palabra esterilización es un término desinformativo que realmente no describe el tipo de cirugía que su mascota ha tenido. El término correcto sería OVARIOHYSTERECTOMY. OVARIO significa “ ovarios”, HYSTER significa “útero” y ECTOMY significa “quitar”. Tanto los ovarios como el útero son extirpados durante la operación. La cirugía, que no es tan simple como la gente pueda pensar, consiste en un procedimiento intraabdominal bastante complejo.

Cuando su mascota es admitida en nuestra clínica se le coloca en una jaula confortable donde se recobrara de la cirugía. A los perros se les administra medicación para calmar los efectos y minimizar el daño derivado de la anestesia general. En perros, la anestesia general es administrada a través de la vena. Posteriormente es insertado un tubo de plástico en la tráquea para suministrar anestesia y oxígeno durante la operación. En los gatos, la anestesia general es administrada vía muscular y se usa una máscara para suministrar anestesia y oxígeno mientras dure la cirugía.

El área del abdomen es depilada y limpiada con desinfectante para eliminar cualquier bacteria presente. Entonces es llevada a la sala de operaciones. Todas nuestras operaciones se realizan con guantes e instrumentos esterilizados. Se hace un corte en la parte interior del musculo. Dentro del abdomen, los ovarios se encuentran cerca de los riñones. Se localiza al principal fluido de sangre de cada ovario y se ata con doble sutura de material que será absorbido en 60 días. Luego se sujeta el útero y es cuando ambos, útero y ovarios, son extirpados. Posteriormente la incisión en el abdomen y en la piel es cerrada con sutura.

Si su mascota esta en celo, embarazada o padece anormalidades en el útero, la cirugía es más complicada y los riesgos que conlleva son mayores. Durante el embarazo, el útero y los vasos sanguíneos se dilatan y la operación se vuelve más difícil. Si hay excesiva grasa, los vasos sanguíneos están ocultos bajo ella y deben ser encontrados y sujetados. El veterinario determinara si su mascota esta en celo o embarazada. Hay un cargo extra cuando la cirugía es complicada ya que la operación requiere más tiempo.

Cuando la operación ha finalizado, la mascota es llevada al área de cuidados. Al atardecer, estará lista para que se la lleven a casa. Algunos animales deben pasar la noche allí pero estarán preparados para ser recogidos a la mañana siguiente. Si este fuera el caso de su mascota nuestro equipo se lo comunicaría tras la operación. Es esencial mantener al animal lo más quieto posible hasta que hayan pasado 5 o 7 días después de la cirugía. Algunos vasos sanguíneos han sido cosidos y atados. Si su actividad es excesiva o demasiado enérgica, las ligaduras podrían soltarse ocasionando graves daños. No hay que olvidar que también hay una línea interior de puntos de sutura en el abdomen. Todo esto le producirá a su mascota una inflamación provocándole una leve subida de temperatura. Si este aumento

de temperatura fuera excesivo entonces es que se habría formado un seroma. No es algo muy grave pero debe ser tratado.

Por favor llame a Seattle Humane Society al 425 6497560 si surge algún problema tras la cirugía como podría ser la falta de apetito, que sangre o supure por la incisión, excesivos fluidos líquidos, hinchazón alrededor de la herida o si el animal aumenta de fiebre. La temperatura rectal normal para perros y gatos es de 101 a 102.5F. Si está muy preocupado por el estado de su mascota y no puede contactar con Seattle Humane Society por favor acuda a su veterinario privado o a un Hospital Veterinario de Urgencias.

## **INSTRUCCIONES POSTERIORES A LA OPERACIÓN**

### *ALIMENTACION*

Los animales que hayan salido entre las 3 y 5 pm deberán ser alimentados con una pequeña comida cuando lleguen a casa. Dar su comida regular y que tengan agua fresca a su disposición. Seguramente tardara de 3 a 4 días en recuperar su apetito normal.

### *MEDICACION PARA EL DOLOR*

La medicación se le proveerá mediante inyección después de la operación. No dar a su animal cualquier tipo de medicación sin antes consultar con su veterinario.

*EJERCICIO RESTRINGIDO* durante los primeros 5 a 7 días después de la cirugía. Es importante no dejar que un gato o un perro castrado salgan fuera de casa a saltar o a trepar. Si es necesario, sepárenlos de otros animales cuando estén en casa.

*MANTENER LOS ANIMALES EN EL INTERIOR* de 10 a 14 días. Su mascota debe estar caliente y seca. No se debe dar baños durante 10 días mientras la incisión este completamente cicatrizada. Un baño podría arrastrar la suciedad y las bacterias hacia la herida.

*MIRAR LA INCISION* Y observar la supuración o la hinchazón. Habrá un bulto duro debajo de la incisión donde los puntos interiores están cicatrizando. Hay una reacción normal a este material de sutura. Los puntos bajo la piel se disolverán en 60 días. Intenten que su mascota no lame o rasque sus heridas. Use un collar Elizabeth, disponible en muchas tiendas de mascotas o cualquier agente amargo como "Chewguard" alrededor de la herida para evitar que se lame mientras cicatriza.

## **INFORMACION ADICIONAL**

Si su gato o perro ha sido esterilizado mientras estaba en celo atraerá machos durante unos cuantos días. No permita que sea cortejada o esta actividad podría ocasionar que se soltaran los puntos internos de sutura. Si hubiera habido complicaciones durante la cirugía siga estas instrucciones al pie de la letra.

**He leído y entendido mis instrucciones posteriores a la operación de mi mascota. Entiendo que si mi incumplimiento o falta de voluntad para completar estas instrucciones puedan ocasionar complicaciones o que si mi mascota desarrolla algún problema posterior a la cirugía pero que no esté relacionado con ella, por ejemplo infecciones respiratorias o tos, necesitare llevar mi animal a mi propio veterinario haciéndome responsable de los gastos que ello ocasione.**

**Firma del propietario**

**Día**